

Calendário de Vacinação da Criança

Idade	Vacinas	Doenças Evitadas
Ao nascer	BCG-ID (intradérmico) Dose única	Formas graves da tuberculose (Meningite tuberculosa, Tuberculose miliar ou sistêmica)
	Hepatite B - 1ª dose	Infecção pelo vírus da hepatite tipo B
1 mês	Hepatite B - 2ª dose	Infecção pelo vírus da hepatite tipo B
2 meses	PENTA* (DTP acelular, Hemófilo influenza tipo b, Pólio Inativada) - 1ª dose	Difteria, Tétano e Coqueluche, Meningite e outras infecções pelo hemófilo e Poliomielite
	Rotavírus** - 1ª dose	Infecção diarreica pelo rotavírus
	Antipneumocócica conjugada 7v - 1ª dose	Meningite, Sinusite, Otite e Pneumonias graves
3 meses	Antimeningocócica C conjugada - 1ª dose	Meningite meningocócica C
4 meses	PENTA* (DTP acelular, Hemófilo influenza tipo b, Pólio Inativada) - 2ª dose	Difteria, Tétano e Coqueluche, Meningite e outras infecções pelo hemófilo e Poliomielite
	Rotavírus** - 2ª dose	Infecção diarreica pelo rotavírus
	Antipneumocócica conjugada 7v - 2ª dose	Meningite, Sinusite, Otite e Pneumonias graves
5 meses	Antimeningocócica C conjugada - 2ª dose	Meningite meningocócica C
6 meses	HEXA* (DTP acelular, Hemófilo influenza tipo b, Pólio Inativada e Hepatite B) - 3ª dose	Difteria, Tétano e Coqueluche, Meningite e outras infecções pelo hemófilo, Poliomielite e Hepatite B
	Antipneumocócica conjugada 7v - 3ª dose	Meningite, Sinusite, Otite e Pneumonias graves
	Influenza ¹	Gripe
9 meses	Febre Amarela ²	Febre Amarela
12 meses	Hepatite A - 1ª dose	Infecção pelo vírus da Hepatite tipo A
	Tríplice Viral - SCR - 1ª dose	Sarampo, Caxumba e Rubéola
	Varicela (Catapora) - 1ª dose	Catapora
15 a 18 meses	PENTA* (DTP acelular, Hemófilo influenza tipo b, Pólio Inativada) - reforço	Difteria, Tétano e Coqueluche, Meningite e outras infecções pelo hemófilo, Poliomielite e Hepatite B
	Antimeningocócica C conjugada - reforço	Meningite meningocócica C
	Antipneumocócica conjugada 7v - reforço	Meningite, Sinusite, Otite e Pneumonias graves
18 meses	Hepatite A - 2ª dose	Infecção pelo vírus da Hepatite tipo A
	Influenza ¹	Gripe
4 a 6 anos	DTP acelular - reforço	Difteria, Tétano e Coqueluche
	Tríplice Viral - SCR - 2ª dose	Sarampo, Caxumba e Rubéola
	Pólio Inativada - reforço	Poliomielite
	Varicela - 2ª dose	Catapora
A partir de 9 anos	Papilomavírus HPV ³ - Três doses	Infecção pelo Papilomavírus

(1) Duas doses, 2ª dose aos sete meses e reforço anual; (2) Reforço a cada 10 anos; (3) Preferencialmente entre 11 e 12 anos;

(*) Vacinas combinadas: uso de mais de um componente em apenas uma aplicação;

(**) A vacina de rotavírus deve ser administrada com um intervalo de 15 dias da vacina contra poliomielite (VOP).

Calendário de Vacinação do Adolescente

Tríplice Viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola)	Dose única. Contra indicada em gestantes e imunodeprimidos.
Difteria, Tétano e Coqueluche (dTpa) ou Difteria e Tétano (dT)	Esquema completo com três doses: apenas reforço com uma dose a cada 10 anos. Esquema incompleto ou desconhecido: completar o esquema com as doses que faltam. Não vacinado: três doses.
Hepatite A, B ou AB	Hepatite A: duas doses. 2ª dose - seis meses após a 1ª dose Hepatite B: três doses. 2ª dose - um mês após a 1ª dose 3ª dose - cinco meses após a 2ª dose. Hepatite AB: três doses. 2ª dose - um mês após a 1ª dose 3ª dose - cinco meses após a 2ª dose.
Antimeningocócica C conjugada	Dose única
Varicela (Catapora)	Duas doses. Contra indicada em gestantes e imunodeprimidos.
Influenza (Gripe)	Dose anual
Febre Amarela (*)	Uma dose de 10 em 10 anos. Contra indicada em gestantes e imunodeprimidos, exceto quando os riscos de adquirir a doença superam os riscos potenciais da vacinação.
Papilomavírus - HPV	Três doses

Fontes: adaptado pelos calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações (Sbim) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). (*) Indicada para pessoas que se deslocam para áreas endêmicas de febre amarela (território nacional e internacional) e para as que vão viajar ou residir nessas áreas. Vacinar pelo menos dez dias antes da viagem.

Calendário de Vacinação do Adulto e Idoso

Vacinas	Esquemas/Comentários
Tríplice Viral - SCR (Sarampo, Caxumba e Rubéola)	Dose única. Indicada para mulheres até 49 anos e homens até 39 anos de idade. Contra indicada em gestantes e imunodeprimidos.
Difteria, Tétano e Coqueluche (dTpa) ou Difteria e Tétano (dT)	Esquema completo com três doses: apenas reforço com uma dose a cada 10 anos. Esquema incompleto ou desconhecido: completar o esquema com as doses que faltam. Não vacinado: três doses
Hepatite A, B ou AB	Hepatite A: duas doses. 2ª dose - seis meses após a 1ª dose Hepatite B: três doses. 2ª dose - um mês após a 1ª dose 3ª dose - cinco meses após a 2ª dose. Hepatite AB: três doses. 2ª dose - um mês após a 1ª dose 3ª dose - cinco meses após a 2ª dose.
Antimeningocócica C conjugada	Dose única, quando indicada, na ocorrência de casos e surtos.
Varicela (Catapora)	Dois doses, com intervalo de dois meses. Contra indicada em gestantes e imunodeprimidos.
Influenza (Gripe)	A vacina contra gripe deverá ser repetida todo o ano
Febre Amarela (*)	Uma dose de 10 em 10 anos. Contra indicada em gestantes e imunodeprimidos, exceto quando os riscos de adquirir a doença superam os riscos potenciais da vacinação.
Antipneumocócica 23 valente	Dose única. Pessoas acima de 60 anos de idade e pessoas portadoras de doenças crônicas (cardiopatas, pneumopatas, diabetes, etc) e outras situações de risco para infecção pelo pneumococo.
Papilomavírus - HPV	Três doses. Indicada em mulheres até 26 anos.

Fonte: adaptado pelo Calendário do Adulto e Idoso da Sociedade Brasileira de Imunizações – SBIM

(*) Indicada para pessoas que se deslocam para áreas endêmicas de febre amarela (território nacional ou internacional) e para as que vão viajar ou residir nessas áreas. Vacinar pelo menos dez dias antes da viagem. É também recomendado pela Organização Mundial da Saúde/OMS como exigência sanitária para viagens internacionais (países de risco da doença).